

Emla Pleisters



Emla Pleister is een geneesmiddel voor plaatselijke verdoving van de huid, bijvoorbeeld bij een injectie of kleine huidoperaties.

Werkzame stoffen: lidocaïne/prilocaine. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Zo gebruik je Emla pleisters bij vaccineren

Zorg dat je handen en de huid op de prikplaats schoon en droog zijn. Kies de arm die je het minst gebruikt. Vraag eventueel hulp van iemand om de pleister op de juiste plek te plakken.



Stap 1

Je kunt als geheugensteuntje het tijdstip van opplakken op de pleister schrijven. Plak de pleister minimaal 1 uur van tevoren op.



Stap 2

Trek de beschermfolie van het zachte huidkleurige gedeelte.



Stap 3

Trek voorzichtig de pleister los.



Stap 4

Raak de witte binnen-cirkel niet aan, daar zit werkzame stof in.



Stap 5

Zo bepaal je de juiste plaats van de pleister: de injectieplaats is ongeveer twee vingerbreedtes onder het acromion (dat is het botje dat je voelt uitsteken op het punt waar je schouder in je bovenarm overgaat).



Stap 6

Plak de pleister op die hoogte, in het midden van de bovenarm. Druk de Emla pleister langs de randen stevig aan, maar druk niet op het midden van de pleister.

Kijk voor meer informatie en de bijsluiter op [emlapeisters.nl](https://www.emlapeisters.nl)

©Aspen Netherlands 2021. Aspen group of companies or its licensor. All rights reserved.

Trademarks are owned by or licensed to the Aspen group of companies. | PM code NL-LID-05-21-00005

Registratiehouder: Aspen Pharma Trading Limited 7 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland
NL: +31 207 095 007

Emla pleister is ingeschreven in het register onder RVG 15721

