



Livsane Hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml, stroop noscapiene

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u dit middel zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

IN DEZE BIJSLUITER

1. Wat is Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml inneemt
3. Hoe wordt Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS LIVSANE HOESTDRANK NOSCAPINE HCL 1 MG/ML EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Geneesmiddelengroep

Noscapiene onderdrukt de hoestprikkel. Noscapiene is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

Gebruiken bij

- prikkelhoest.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LIVSANE HOESTDRANK NOSCAPINE HCL 1 MG/ML INNEEMT

Gebruik Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor noscapiene of voor één van de andere bestanddelen van Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Wees extra voorzichtig met Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De aangegeven dosering niet overschrijden. *Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.*

Gebruik van Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml en andere (genees)middelen.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Over het gebruik van noscapiene tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend. *Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.*

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Noscapiene kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapiene tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapiene.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Noscapiene kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals

deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml

Eén ml stroop bevat 0,745 g saccharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering (=30 ml) levert elke dosis 22,35 g saccharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. *Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.* Verder kan saccharose maagdarmlaesten en diarree veroorzaken.

Dit product bevat methylparahydroxybenzoaat, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

3. HOE WORDT LIVSANE HOESTDRANK NOSCAPINE HCL 1 MG/ML INGENOMEN

Volg bij het gebruik van Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Volwassenen

15-30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur).

Kinderen van 6-12 jaar

15 ml 2 tot 4 maal per dag.

Kinderen van 3-6 jaar

7,5 ml 2 tot 4 maal per dag.

Als u merkt dat Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet overschrijden.

U mag de stroop niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u meer van Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Livsane hoestdrank Noscapiene HCl 1 mg/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog of neusslijmvlies.

Zenuwstelsel

Sufheid, duizeligheid.

Maag- en darmstelsel

Misselijkheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U LIVSANE HOESTDRANK NOSCAPINE HCL 1 MG/ML?

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de fles nog 6 maanden houdbaar.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Livsane hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml

- Het werkzame bestanddeel is noscapinehydrochloride, 1 mg per ml stroop.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn citroenzuur (E330), methylparahydroxybenzoaat (E218), saccharoïdenatrium, saccharose, frambozenessence, gezuiverd water.

Hoe ziet Livsane hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Fles à 150 en 300 ml stroop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Brocacef Supplies & Services BV
Straatweg 2
3604 BB Maarssen
Nederland

Fabrikant
Pharmachemie BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 102469, stroop 1 mg/ml.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2017.