



Echinaforce® tabletten

sterk 1200 mg

Echinacea-extract

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit traditioneel kruidengeneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om A.Vogel Echinaforce tabletten sterk 1200 mg zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter: het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg uw arts indien na 2 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van klachten wordt bemerkt of wanneer klachten terugkeren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat zijn A.Vogel Echinaforce tabletten sterk 1200 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Echinaforce tabletten sterk 1200 mg gebruikt?
3. Hoe worden A.Vogel Echinaforce tabletten sterk 1200 mg gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u A.Vogel Echinaforce tabletten sterk 1200 mg?
6. Algemene informatie.

1. Wat zijn A.Vogel Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

Traditioneel kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt bij onvoldoende weerstand, bij griep en verkoudheid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg gebruikt?

Wanneer mag u Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg niet gebruiken?

Overgevoeligheid (allergie) voor planten van de familie van de Echinacea purpurea, soja, pinda's of één van de andere componenten van Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg?

Omdat dit geneesmiddel lactose bevat dient u, indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaal-

de suikers niet verdraagt, contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg in combinatie met voedsel en drank.

Echinaforce tabletten sterk 1200 mg kan in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

Gebruik van Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Echinaforce tabletten sterk 1200 mg niet gebruiken tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Echinaforce tabletten sterk 1200 mg beïnvloeden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van A.Vogel Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg in combinatie met andere geneesmiddelen.

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.

3. Hoe worden A.Vogel Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg gebruikt?

Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen:
2-3 maal daags 1 tablet.

Kinderen 6-12 jaar: *1-2 maal daags 1 tablet.*

Voor de maaltijd met wat water innemen.



Als de klachten verergeren of wanneer na 2 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

Wat moet u doen wanneer u te veel Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg heeft ingenomen?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Echinaforce tabletten sterk 1200 mg heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten

Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg in te nemen.

Wanneer u Echinaforce tabletten sterk 1200 mg vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar wacht tot het eerstvolgende tijdstip en neem dan de gebruikelijke hoeveelheid in.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg wordt gestopt?

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Echinaforce tabletten sterk 1200 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Allergische huidreacties zoals jeuk en huiduitslag komen zelden voor. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden

via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u A.Vogel Echinaforce® tabletten sterk 1200 mg?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Na opening van de pot nog 7 maanden houdbaar. Droog bewaren.

6. Algemene informatie

Echinaforce tabletten sterk 1200 mg zijn verkrijgbaar in een verpakking van 30 tabletten.

Vraag uw arts of apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn: ethanol-extract van verse bloeiende Echinacea purpurea. Een tablet (750 mg) bevat 1200 mg plantenextracten (Echinacea purpurea kruid en wortels) (extractiemiddel: ethanol 65% (v/v)). Dit komt overeen met 317-629 mg verse Echinacea planten. Tijdens het bereidingsproces van de tabletten worden de ethanolextracten gedroogd tot gedroogde plantenextracten.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, aardappelzetmeel, sojapolysacchariden, magnesiumstearaat.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

A.Vogel B.V.

J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 – 246 46 46 of een e-mail sturen naar info@avogel.nl

A.Vogel Echinaforce tabletten sterk 1200 mg is in het register voor farmaceutische producten ingeschreven onder RVG 104869 AV.

GEDetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (<http://www.cbg-meb.nl>).

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd in oktober 2020.



A.Vogel