

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

**Maalox®, 200 mg/400 mg kauwtabletten**  
*aluminiumoxide/magnesiumhydroxide*

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

### 1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Maalox wordt gebruikt voor de behandeling van klachten die worden veroorzaakt door een teveel aan zuur in de maag en slokdarm, zoals brandend maagzuur en zure oprispingen. De kauwtabletten verminderen de hoeveelheid zuur in uw maag.

### 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

#### Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- De werking van uw nieren is ernstig gestoord (nierfunctiestoornissen).

De kauwtabletten bevatten sucrose en sorbitol. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

#### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wees extra voorzichtig met dit middel als u nierstenen heeft. Overschrijd de aangegeven dosering niet en gebruik dit middel niet langdurig. Neem contact op met uw arts als de klachten aanhouden of terugkeren.

- Gebruik dit middel niet langdurig in grote hoeveelheden zonder advies van uw arts. Na langdurig gebruik van hoge dosissen kan een te laag fosfaatgehalte in uw bloed ontstaan, waardoor er een risico is dat uw botten zwakker en zachter worden dan normaal (osteomalacie).
- Als u ondervoed bent of weinig fosfaat (eiwitten) binnen krijgt met uw voeding, mag u dit middel alleen gebruiken op advies van uw arts.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar mag dit middel alleen worden gebruikt op advies van een arts.
- In de volgende gevallen mag u dit middel niet langdurig of in hoge dosissen gebruiken: uw nieren werken minder goed.
  - In zeldzame gevallen kan langdurig gebruik leiden tot een aandoening van de hersenen die gekenmerkt wordt door stuipen en bewustzijnsverlies (encefalopathie), tot een teveel aan magnesium in het bloed wat soms gepaard kan gaan met sufheid, lage bloeddruk, lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart, tot dementie of tot een bepaalde vorm van bloedarmoede. Bij nierpatiënten kan het gebruik van hoge dosissen verstopping van de darmen veroorzaken of verergeren.
  - u heeft Alzheimer of een andere vorm van dementie.
  - u heeft porfyrie en u dialyseert. Dit middel is mogelijk niet veilig voor u.

Dit middel kan verstopping van de darmen of een trage stoelgang veroorzaken.

De behandeling met Maalox kan de verschijnselen van maagkanker maskeren. Dit kan de herkenning hiervan door de arts vertragen.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Maalox nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem de volgende geneesmiddelen niet op hetzelfde tijdstip in als Maalox kauwtabletten:

- tetracyclines (bepaalde middelen tegen infecties),
- hartglycosiden, zoals digoxine (middelen die de pompwerking van het hart bevorderen),
- atropine (gebruikt bij oogonderzoek),
- cimetidine (gebruikt bij brandend maagzuur),
- bisacodyl (gebruikt bij verstopte darmen),
- chloorpromazine (gebruikt bij psychische aandoeningen),
- isoniazide (gebruikt bij tuberculose),
- ijzerpreparaten.

Als u één van deze geneesmiddelen gebruikt, neem dat middel dan als eerste in, wacht vervolgens minstens een half uur en gebruik dan pas Maalox kauwtabletten. De kauwtabletten kunnen anders de opname in het bloed van deze geneesmiddelen verstoren.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

#### *Zwangerschap*

U kunt dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap innemen in de gebruikelijke dosering (zie in rubriek 3).

#### *Borstvoeding*

Het wordt in de moedermelk uitgescheiden.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Maalox heeft waarschijnlijk geen effect op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

### **Maalox bevat sorbitol en sucrose**

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

## **3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiters of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is een kauwtablet per keer, vier keer per dag (24 uur). Gebruik de kauwtablet steeds een uur na elke maaltijd en vlak voor het slapen gaan. Kauw de tabletten goed.

Bij ernstige klachten kunt u de gebruikelijke dosering verdubbelen (twee tabletten per keer, vier keer per dag).

### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Wanneer u meer kauwtabletten heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis van Maalox om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

*Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)*

- Diarree en constipatie.

*Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)*

- Na langdurige toediening van magnesiumhydroxide aan patiënten met nierinsufficiëntie, verhoogd magnesiumgehalte in het bloed, met soms sufheid, lage bloeddruk, lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart (hypermagnesiëmie)

*Niet bekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)*

- Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, met of zonder hevige jeuk en bultjes, plotseling zwelling van de huid en slijmvlies, met of zonder ademhalingsproblemen, en allergische reacties.
- Door de aanwezigheid van aluminium kan de opname van fosfaat in het maagdarmkanaal verminderen. Hierdoor kan na langdurig gebruik van hoge dosissen in zeldzame gevallen verschijnselen van een tekort aan fosfaat in het lichaam ontstaan (zoals spierzwakte, vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of in de vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blisterverpakking na "Exp". Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

## **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stoffen in dit middel zijn aluminiumoxide (als algeldraat) en magnesiumhydroxide. Een kauwtablet bevat 200 mg aluminiumoxide en 400 mg magnesiumhydroxide.

De andere stoffen in dit middel zijn sacharose (welke 3% zetmeel bevat), sorbitol (E420), mannitol (E421), magnesiumstearaat (E470b), natriumsacharine (E954), pepermuntsmakstof en sucrose.

### **Hoe ziet Maalox eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Maalox kauwtabletten zijn rond, plat en wit. Ze zijn beschikbaar in dozen met 20, 40, 50 of 100 kauwtabletten in blisterverpakking (PVC/aluminium).

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### Vergunninghouder

Genzyme Europe B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Tel: 020 245 4000

#### Fabrikant

Sanofi S.p.A

Scoppito, Italië.

**In het register ingeschreven onder RVG 112421.**

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2020**