

PRIODERM® Dimeticon Lotion

Lotion op basis van dimeticon om hoofdluizen en neten te bestrijden

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door. Deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit medisch hulpmiddel is voor de behandeling van hoofdluizen en neten. Het is belangrijk om Prioderm Dimeticon Lotion zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies, indien gewenst.

Inhoud van deze gebruiksaanwijzing:

1. Wat is Prioderm Dimeticon Lotion en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Prioderm Dimeticon Lotion gebruikt?
3. Hoe wordt Prioderm Dimeticon Lotion gebruikt?
4. Hoe bewaart u Prioderm Dimeticon Lotion?

Hoofdluis

Hoofdluizen zijn met het blote oog zichtbaar, maar omdat ze zich door het haar bewegen, zijn ze soms moeilijk te ontdekken. Een volwassen hoofdluizen is 2-4 mm lang en kan in kleur variëren van lichtgrijs tot zeer donker. De eitjes zijn veel moeilijker zichtbaar, wit en nauwelijks 1 mm groot.

Hoofdluis komt alleen voor bij mensen. Hoofdluizen kunnen niet springen of vliegen en ze komen meestal voor vlak bij de hoofdhuid, in het bijzonder rondom de oren en aan de achterkant van het hoofd en onder de pony. Hoofdluizen leven van bloed. Besmetting door hoofdluizen treedt gewoonlijk op door direct hoofdcontact, bijvoorbeeld tijdens het spelen. Daardoor verspreiden hoofdluizen zich in het algemeen onder kinderen.

1. Wat is Prioderm Dimeticon Lotion en waarvoor wordt het gebruikt?

Prioderm Dimeticon Lotion wordt gebruikt voor de behandeling van hoofdluizen en neten. De verpakking bevat 100 ml lotion, een stalen netenkam en deze gebruiksaanwijzing. Prioderm Dimeticon Lotion is een heldere kleurloze vloeistof, die op **droog haar** moet worden aangebracht. De lotion moet **15 minuten inwerken**. Daarna kan het haar met een gewone shampoo gewassen worden.

Prioderm Dimeticon Lotion bestrijdt hoofdluizen en neten. Hoofdluizen kunnen niet resistent worden voor het middel. Prioderm Dimeticon Lotion bevat bestanddelen die volledig zijn getest en die worden gebruikt in veel soorten cosmetica, waaronder producten voor kinderen. Kinderen vanaf 6 maanden en moeders tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode kunnen Prioderm Dimeticon Lotion gebruiken.

2. Wat u moet weten voordat u Prioderm Dimeticon Lotion gebruikt?

- Gebruik Prioderm Dimeticon Lotion niet als u overgevoelig (allergisch) bent voor één van de bestanddelen. Als irritatie of overgevoeligheid optreedt, moet u met de behandeling stoppen en uw haar wassen met water en shampoo. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.
- Zorg dat Prioderm Dimeticon Lotion niet in de ogen komt. Mocht Prioderm Dimeticon Lotion in contact komen met de ogen, spoel ze dan grondig uit met lauwwater. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.
- Als Prioderm Dimeticon Lotion op de vloer of een andere ondergrond wordt gemorst, kan deze glad worden.
- **Waarschuwing!** Houd haren altijd verwijderd van open vuur, sigaretten en andere ontstekingsbronnen.
- Kijk voor meer informatie over (de behandeling van) hoofdluizen in het algemeen of Prioderm Dimeticon Lotion in het bijzonder, op www.prioderm.nl

3. Hoe wordt Prioderm Dimeticon Lotion gebruikt?

Prioderm Dimeticon Lotion is een lotion die moet worden aangebracht op droog haar. Per behandeling is ca. 20-100 ml lotion nodig, afhankelijk van de haarlengte en het haartype. Voor schouderlang haar volstaat 30-50 ml per behandeling. Het is belangrijk dat u een ruime hoeveelheid lotion aanbrengt, voldoende om alle haren volledig te bedekken, van de hoofdhuid tot aan de uiteinden.

Ga als volgt te werk:

- Draai het dopje van de punt van de applicatorflles en breng de lotion met de handige applicatorflles over de gehele hoofdhuid aan.
- Masseer Prioderm Dimeticon Lotion grondig in het haar en op de hoofdhuid tot het gehele haar, van hoofdhuid tot aan de uiteinden, is bedekt.
- **Laat Prioderm Dimeticon Lotion ten minste 15 minuten inwerken.**
- Breng vervolgens een ruime hoeveelheid shampoo zonder water aan en masseer de shampoo in het haar.
- Spoel pas daarna het haar uit met water. Het kan nodig zijn om het haar 2-4 maal met shampoo te wassen voordat het niet meer vettig aanvoelt. Was het een aantal keren totdat de shampoo goed op schuimt.
- Kam de haren met een borstel of grove kam, zodat eventuele klitten verwijderd zijn. Bij lang haar is het makkelijk de haren in 4 gelijke delen te verdelen met behulp van elastiekjes of klemmen.

- Kam elk deel grondig uit met de toegevoegde netenkam. Na elke kambeweging de netenkam uitspoelen en/of afdrogen met een tissue. Als er luizen of eitjes in de kam zitten, verwijderd u deze onmiddellijk met veel water.
- Herhaal het proces met de andere delen. Het kost ongeveer 20-25 minuten om de haren goed en zorgvuldig door te kammen.
- **Belangrijk:** herhaal de behandeling na 9-10 dagen. Dit is noodzakelijk om de levenscyclus van de hoofdluizen te doorbreken. Zet het op de kalender of stel het alarm van uw mobiele telefoon in, zodat u het niet vergeet.

Het is ook belangrijk dat u alle gezinsleden controleert als er eenmaal hoofdluizen zijn aangetroffen en vergeet uzelf niet! Gezinsleden bij wie hoofdluizen zijn aangetroffen, moeten tegelijkertijd worden behandeld om herbesmetting binnen het gezin tegen te gaan.

Herbesmetting: herbesmetting kan optreden nadat de behandeling is gestart. Behandel in dat geval onmiddellijk opnieuw met Prioderm Dimeticon Lotion en herhaal de behandeling na 9-10 dagen. Er bestaat geen risico dat hoofdluizen resistent worden voor Prioderm Dimeticon Lotion.

4. Hoe bewaart u Prioderm Dimeticon Lotion?

Bewaar Prioderm Dimeticon Lotion in de gesloten, oorspronkelijke verpakking, samen met deze gebruiksaanwijzing, bij kamertemperatuur en **buiten bereik van kinderen**. Niet gebruiken na de vervaldatum. Draai het dopje na gebruik stevig op de punt van de applicatorflles.

LOT

Chargennummer



Lees de gebruiksaanwijzing



Opmerking



Bewaren



Vervaldatum



Fabrikant

MEDA

Distributeur in Nederland



Medisch hulpmiddel

TECHNISCHE GEGEVENS • **Productnaam:** Prioderm Dimeticon Lotion. **Bestanddelen (INCI):** Dimethicone, tocopheryl acetate, prunus armeniaca, prunus dulcis. **Beoogd gebruik:** Behandeling van hoofdluizen en neten. **Inhoud:** 100 ml. **Registratie:** Prioderm Dimeticon Lotion is geïndiceerd als klasse 1 medisch hulpmiddel volgens Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. **Bewaren:** Bewaar op een droge plaats bij kamertemperatuur. Niet gebruiken na de vervaldatum; buiten bereik van kinderen bewaren. **Opmerking:** Houd haren altijd verwijderd van open vuur, sigaretten en andere ontstekingsbronnen. Als Prioderm Dimeticon Lotion in contact komt met de ogen, spoel ze dan grondig uit met lauwwater. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt. **Fabrikant:** Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italië. **Distributeur in NL:** Meda Pharma B.V., Amstelveen; info@prioderm.nl. **Laatste wijziging van de gebruiksaanwijzing:** augustus 2017. 9019

Specification box: instructions/leaflet

MEDA

PRODUCT: Prioderm Dimeticon Lotion 100 ml

MANUFACTURER: Meda Pharma S.p.A.

MEDA NUMBER: 9019

EXTRA CODE: -

EXTRA CODE: -

BAR/EAN-CODE: -

PACK SIZE: 152 x 214 mm

COUNTRY: The Netherlands / NL

LANGUAGE: Dutch

MEDA: Marieke van der Hulst

COLOURS USED: 1



Black