

---

## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER**

### **Sperti Preparation H, aambeienzetspillen voor rectaal gebruik**

Per zetpil: 23 mg levende gist extract en 69 mg haaienlevertraan

#### **Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar. Desondanks moet u Sperti Preparation H, aambeienzetspillen, zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### **In deze bijsluiter:**

1. Wat zijn Sperti Preparation H, aambeienzetspillen en waarvoor worden deze gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Sperti Preparation H, aambeienzetspillen gebruikt
3. Hoe worden Sperti Preparation H, aambeienzetspillen gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sperti Preparation H, aambeienzetspillen
6. Aanvullende informatie

## **1. WAT ZIJN SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZETPILLEN EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT**

### **Farmaceutische vorm en inhoud**

- Sperti Preparation H, aambeienzetspillen zijn zetspillen die rectaal (in de anus) worden ingebracht en zijn in een kunststof PVC/PE strip verpakt in doosjes met 12 of 24 zetspillen.

### **Geneesmiddelengroep**

- Sperti Preparation H, aambeienzetspillen behoren tot de aambeienpreparaten.

### **Therapeutische indicaties**

- Te gebruiken bij behandeling van klachten ten gevolge van aambeien, zoals jeuk, vochtafscheiding, bloedinkjes, pijn, of een combinatie van deze verschijnselen.

## **2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZETPILLEN GEBRUIKT**

### **Gebruik Sperti Preparation H aambeienzetspillen niet**

als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van Sperti Preparation H, aambeienzetspillen.

### **Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen**

---

Er zijn tot op heden géén meldingen geweest van wisselwerking met andere geneesmiddelen.

### **Kinderen**

Er is geen of zeer beperkte informatie over de behandeling van aambeien bij kinderen, het gebruik is derhalve niet aanbevolen bij kinderen.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Sperti Preparation H, aambeienzetspillen kunnen - voor zover bekend - zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Voor zover bekend hebben Sperti Preparation H, aambeienzetspillen géén invloed op de rijvaardigheid of het vermogen machines te gebruiken.

## **3. HOE WORDEN SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZETPILLEN GEBRUIKT**

### **Dosering en wijze van toedienen**

Breng bij klachten ´s-morgens en ´s-avonds en na elke stoelgang één zetpil in de anus. Reinig de anale opening na elke stoelgang eerst met zacht toiletpapier en dan met een washandje en lauwwater. Droog daarna voorzichtig of, beter nog, dep voorzichtig droog met een zachte handdoek.

### **Duur van de behandeling**

U mag het product niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Raadpleeg bovendien uw arts, indien de klachten aanhouden of terugkeren, en bij pijnlijke en bloedende aambeien.

In geval u bemerkt dat Sperti Preparation H, aambeienzetspillen te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### **Wat u moet doen wanneer u te veel Sperti Preparation H, aambeienzetspillen heeft gebruikt.**

Wanneer u te veel Sperti Preparation H, aambeienzetspillen heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Sperti Preparation H, aambeienzetspillen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

- *Aandoeningen van huid of onderhuid*  
Zeer zelden (< 1: 10000 inclusief afzonderlijke gevallen) kunnen overgevoelighedsreacties ontstaan, die na staken van de behandeling weer verdwijnen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

## **5. HOE BEWAART U SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZETPILLEN**

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Niet bewaren boven 25 °C.

Gebruik Sperti Preparation H, aambeienzepillen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter 'Niet te gebruiken na' of op de zetpilstrip achter 'exp'.

## **6. AANVULLENDE INFORMATIE**

### **Wat bevat Sperti Preparation H, aambeienzepillen**

- De werkzame bestanddelen zijn:  
Per zetpil: 23 mg levende gist extract en 69 mg haaienlevertraan
- De andere bestanddelen zijn:  
Glycerol (E 422), Lunacera M, cacao boter, witepsol W35 en polyethyleenglycol 600 dilauraat

**Hoe zien Sperti Preparation H, aambeienzepillen er uit en de inhoud van de verpakking**  
Zetpillen verpakt in een kunststof PVC/PE strip in doosjes met 12 of 24 zetpillen.

### **Registratiehouder en fabrikant**

#### Registratiehouder

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V. , Van Asch van Wijkstraat 55G, 3811 LP  
Amersfoort, Nederland

#### Fabrikant

Haupt Pharma Livron  
Rue Compte de Sinard, 26250 Livron sur drome  
France

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op Juli 2020**

### **Algemene voorzorgsmaatregelen bij aambeien en het gebruik van Sperti Preparation H, aambeienzepillen:**

- Aambeien zijn uitgezette bloedvaatjes, die soms zichtbaar zijn als knobbels rond de anusopening (uitwendige aambeien). Soms zitten ze binnen de anus en zijn ze onzichtbaar

---

(inwendige aambeien). Vaak zijn aambeien het gevolg van overmatige druk op de bloedvaatjes rond de anus, bv. bij moeilijke stoelgang of zwangerschap.

- Probeer de stoelgang te bevorderen, door voedingsmiddelen zoals rogge- of volkorenbrood, zilervliesrijst, verse groente en fruit (pruimen) te eten, en door voldoende aan lichaamsbeweging te doen.
- Wacht niet te lang en neem alle tijd om naar het toilet te gaan.
- Zorg voor goede hygiëne, zoals het zorgvuldig wassen van de anusstreek.
- Verwijder irriterend materiaal. Dit kan helpen de symptomen van aambeien te verlichten.